

БРУЦЕЛЛЁЗ ЖИВОТНЫХ, в том числе ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭПИДИДИМИТ БАРАНОВ (ИЭБ)

хроническая инфекционная болезнь всех млекопитающих, в том числе и человека (за исключением *B.ovis*), вызываемая бактериями рода *Brucella*. На территории России циркулируют преимущественно культуры *B.abortus*, *B.melitensis*, *B.ovis*, *B.canis*. Наиболее восприимчивы к заражению: крупный и мелкий рогатый скот, олени, собаки; к заражению *B.ovis* (ИЭБ) - восприимчивы овцы и бараны.

Источник возбудителя инфекции.

Больные животные

Инкубационные период.

От 25-30 дней, у молодняка полученного от больных матерей 12-14 мес.

Клинические признаки. Аборты. Рождение мертвого приплода. Задержание последа. Зачастую заболевание протекает бессимптомно.

Патологоанатомические изменения.

Некротические плацентиты у коров, фибринозные перикардиты и плевриты у телят (рис.1)*. Эпидидимит (ИЭБ).

Лабораторная диагностика.

Наставление по диагностике бруцеллеза животных, 2003.

ГОСТ 33675-2015 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Бактериологические методы.

ГОСТ 34105-2017 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы.

Для исследования направляют:

абортованные плоды или материал от них, парные лимфатические узлы (подчелюстные, заглоточные, околоушные, предлопаточные, коленной складки, паховые от самцов, надвывеменные от самок, подколенные, мезентериальные, образцы селезенки и

печени, часть матки с котиледонами, сыворотку крови, кровь с антикоагулянтом.

Серологическое исследование: РБП, РА, РСК (РДСК), РДСК с R-антителом (ИЭБ), РИД с ОПС-антителом, РНГА, ИФА, ПФИА, КР с молоком.

Бактериологическое исследование:

Бактериоскопия. Выделение чистой культуры возбудителя. Постановка биопробы.

Аллергическое исследование: пробы и бруцеллином и бруцеллотином (ИЭБ).

Молекулярно-генетическое исследование:

ПЦР и ПЦР-ПДРФ.
Меры профилактики и борьбы. Приказ Минсельхоза России от 8 сентября 2020 года N 533 Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов).

Вакцины, применяемые для профилактики бруцеллеза животных и ИЭБ: живые сухие из штаммов: *B.abortus* 19 (в т.ч. ИЭБ), 82, 75/79 АВ; *B.melitensis* Rev1 (в т.ч. ИЭБ).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

Описание рисунков:

- * Патологические изменения при бруцеллезе.
- Бактериологическое исследование на бруцеллез.
- При окраске по Граму бруцеллы грамотрицательные (окрашиваются в красный цвет), шаровидной, оvoidной или палочковидной формы. Размеры бруцелл в среднем: 0,3 – 0,6 мкм для кокковых форм и 0,6 – 2,5 мкм для палочковидных. Спор и капсул не образуют, жгутиков не имеют, неподвижные (электронная микроскопия).
- Рост бруцелл на плотных питательных средах – колонии округлые, блестящие, гладкие, в проходящем свете – прозрачные, с янтарным оттенком или слегка опалесцируют